

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL COMUNIDAD DE MADRID. Semana 37

## Red de Vigilancia Epidemiológica

**Martes, 15 de septiembre de 2026** *(datos provisionales)*

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA                                               | Pág. 2  |
| 2. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASIVA                                                     | Pág. 4  |
| 3. VIGILANCIA CENTINELA DE LAS INFECCIONES<br>RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)                 | Pág. 5  |
| 4. BROTES EPIDÉMICOS                                                                     | Pág. 9  |
| 5. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS<br>DE CALOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID | Pág. 10 |
| 6. VIGILANCIA DE LAS ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS<br>DE CARBAPENEMASAS (EPC)              | Pág. 13 |

Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública  
Dirección General de Salud Pública

Tfno.: +34 91370 08 88

Correo-e: [epidemiologia.vigilancia@salud.madrid.org](mailto:epidemiologia.vigilancia@salud.madrid.org)

**1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. COMUNIDAD DE MADRID.**

**Datos acumulados hasta la semana 37 de 2026** (semana que finaliza el 13 de septiembre de 2026) y comparación con el mismo periodo del año anterior.

**1.1.- Enfermedades de Declaración Obligatoria. Casos acumulados e Índice Epidémico. Años 2026 y 2025 (sólo se incluyen en la tabla las enfermedades que han presentado casos notificados en el año en curso).**

| Enfermedad                                                | 2026<br>(sem 1-37) | 2025<br>(sem 1-37) | IE*  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>Enfermedades de transmisión respiratoria</b>           |                    |                    |      |
| Gripe                                                     | 19.497             | 60.947             | 0,32 |
| Legionelosis                                              | 72                 | 100                | 0,72 |
| Lepra***                                                  | 1                  | 2                  | --   |
| Tuberculosis                                              | 444                | 448                | 0,99 |
| <b>Enfermedades de transmisión alimentaria</b>            |                    |                    |      |
| Botulismo***                                              | 3                  | 2                  | --   |
| Campilobacteriosis**                                      | 3.581              | 4.414              | --   |
| Criptosporidiosis                                         | 98                 | 128                | 0,77 |
| <i>E. coli</i> productor toxina Shiga o Vero              | 55                 | 87                 | 0,63 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea***                         | 7                  | 4                  | --   |
| Giardiasis                                                | 300                | 385                | 0,78 |
| Hepatitis A                                               | 106                | 343                | 0,31 |
| Listeriosis                                               | 28                 | 24                 | 1,17 |
| Salmonelosis (exc. fiebre tif. y paratif.)                | 969                | 1.054              | 0,92 |
| Shigelosis                                                | 210                | 234                | 0,90 |
| Yersiniosis                                               | 117                | 98                 | 1,19 |
| <b>Enfermedades de transmisión sexual y parenteral**</b>  |                    |                    |      |
| Hepatitis B <sup>1</sup>                                  | 10                 | 22                 | --   |
| Hepatitis C                                               | 65                 | 290                | --   |
| Infección gonocócica                                      | 4.326              | 6.209              | --   |
| Inf. <i>Chlamydia trachomatis</i> (exc. LGV)              | 3.366              | 5.019              | --   |
| Linfogranuloma venéreo                                    | 374                | 582                | --   |
| Mpox <sup>2</sup>                                         | 406                | 186                | --   |
| Sífilis                                                   | 1.063              | 1.384              | --   |
| <b>Zoonosis***</b>                                        |                    |                    |      |
| Fiebre Q                                                  | 16                 | 14                 | --   |
| Hidatidosis                                               | 1                  | 7                  | --   |
| Toxoplasmosis congénita                                   | 1                  | 0                  | --   |
| <b>Enfermedades prevenibles por vacunación</b>            |                    |                    |      |
| Enf. invasiva por <i>H.influenzae</i>                     | 65                 | 60                 | 1,08 |
| Enf. meningocócica invasiva                               | 41                 | 37                 | 1,11 |
| Enf. neumocócica invasiva                                 | 367                | 455                | 0,81 |
| Herpes zóster                                             | 25.551             | 25.149             | 1,02 |
| Parotiditis                                               | 118                | 187                | 0,63 |
| P.F.A. (< 15 años)***                                     | 4                  | 6                  | --   |
| Sarampión***                                              | 53                 | 6                  | --   |
| Tétanos***                                                | 1                  | 0                  | --   |
| Tosferina                                                 | 46                 | 43                 | 1,07 |
| Varicela                                                  | 1.085              | 966                | 1,12 |
| <b>Enfermedades notificadas por Sistemas Especiales**</b> |                    |                    |      |
| EETH (Encef. Espongif. Tr. Humanas)                       | 10                 | 8                  | --   |
| <b>Enfermedades de transmisión vectorial***</b>           |                    |                    |      |
| Dengue                                                    | 55                 | 50                 | --   |
| Encefalitis transmitida por garrapatas                    | 1                  | 0                  | --   |
| Enf. por virus Chikungunya                                | 29                 | 17                 | --   |
| Fiebre exantemática mediterránea                          | 9                  | 19                 | --   |
| Leishmaniasis                                             | 43                 | 56                 | --   |
| Paludismo                                                 | 64                 | 95                 | --   |

\*Se calcula el Índice epidémico (IE) para cada enfermedad dividiendo los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

\*\*No se calcula el IE en aquellas enfermedades en las que el circuito de notificación presenta demora en la inclusión de caso.

\*\*\* No se calcula el IE en las enfermedades de baja incidencia.


<sup>1</sup>Desde enero de 2026 solo se contabilizan hepatitis B agudas.

<sup>2</sup>Mpox: hasta la semana 37 de 2026 se han registrado en la Comunidad de Madrid 281 casos de mpox clado I. De ellos, 41 casos son clado I sin subtipar y 240 casos son clado Ib. De estos 240 casos clado Ib, 3 casos presentan coinfección con clado II. Respecto a la vacunación, de los 406 casos notificados, 25 estaban vacunados previamente con 1 dosis actual y 69 estaban vacunados con dos dosis actuales de vacuna frente a la viruela.

**¡Aviso!** Como consecuencia de la implementación de la nueva aplicación informática de EDO, los registros del año pueden experimentar variaciones intersemanales debido a ajustes y consolidación de la información.

## 1.2.- Patrón temporal de EDO seleccionadas. Datos hasta la semana 37 de 2026 (semana que finaliza el 13 de septiembre de 2026).

Se presenta la distribución de casos por semana de notificación de algunas enfermedades seleccionadas según criterios de magnitud (nº de casos en la semana e índice epidémico) o características de la enfermedad (patrón estacional, posibilidad de presentación en forma de brotes epidémicos, etc.).



## 2. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASIVA. COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2026. Datos hasta la semana 37 de 2026 y comparación con el mismo período del año anterior.

### 2.1.- Incidencia y letalidad de casos confirmados y sospechosos de enfermedad meningocócica invasiva.

|                       | AÑO 2026  |             |            |               | AÑO 2025  |             |            |               |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|
|                       | Casos     | Tasas*      | Fallecidos | Letalidad (%) | Casos     | Tasas*      | Fallecidos | Letalidad (%) |
| Serogrupo A           | 0         | 0           | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0             |
| Serogrupo B           | 21        | 0,3         | 3          | 14,3          | 26        | 0,37        | 3          | 11,5          |
| Serogrupo C           | 1         | 0,01        | 0          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0             |
| Serogrupo W           | 1         | 0,01        | 0          | 0             | 7         | 0,1         | 1          | 14,3          |
| Serogrupo Y           | 8         | 0,11        | 1          | 12,5          | 1         | 0,01        | 1          | 100           |
| Serogrupo desconocido | 8         | 0,11        | 0          | 0             | 2         | 0,03        | 0          | 0             |
| No tipable            | 1         | 0,01        | 1          | 100           | 1         | 0,01        | 0          | 0             |
| Total confirmados     | 40        | 0,56        | 5          | 12,5          | 37        | 0,52        | 5          | 13,5          |
| Sospecha clínica      | 1         | 0,01        | 1          | 100           | 0         | 0           | 0          | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>41</b> | <b>0,58</b> | <b>6</b>   | <b>14,6</b>   | <b>37</b> | <b>0,52</b> | <b>5</b>   | <b>13,5</b>   |

\*Tasas por 100.000 habitantes. Estadística continua de población, año 2025.

### 2.2.- Distribución de casos e incidencia\* por año epidemiológico, grupo de edad y serogrupos B, C, W e Y.

|              | Serogrupo B |            |       |            | Serogrupo C |            |       |            | Serogrupo W |            |       |            | Serogrupo Y |            |       |            |
|--------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|
|              | 2026        |            | 2025  |            | 2026        |            | 2025  |            | 2026        |            | 2025  |            | 2026        |            | 2025  |            |
|              | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia | Casos       | Incidencia | Casos | Incidencia |
| 0 a 1 año    | 2           | 1,96       | 1     | 0,98       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 1     | 0,98       | 1           | 0,98       | 0     | 0          |
| 2 a 4 años   | 1           | 0,63       | 2     | 1,27       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 0     | 0          |
| 5 a 14 años  | 2           | 0,29       | 3     | 0,44       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 0     | 0          | 1           | 0,15       | 0     | 0          |
| 15 a 44 años | 9           | 0,33       | 10    | 0,37       | 1**         | 0,04       | 0     | 0          | 0           | 0          | 3     | 0,11       | 1           | 0,04       | 0     | 0          |
| 45 a 64 años | 4           | 0,19       | 5     | 0,23       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 1     | 0,05       | 2           | 0,09       | 0     | 0          |
| 65 a 74 años | 0           | 0          | 3     | 0,45       | 0           | 0          | 0     | 0          | 0           | 0          | 1     | 0,15       | 1           | 0,15       | 0     | 0          |
| >74 años     | 3           | 0,44       | 2     | 0,3        | 0           | 0          | 0     | 0          | 1           | 0,15       | 1     | 0,15       | 2           | 0,3        | 1     | 0,15       |

\*Tasas por 100.000 habitantes. Estadística continua de población, año 2025.

\*\*Varón de 18 años de origen venezolano, recién llegado a España y sin vacunación documentada.

### 3. VIGILANCIA CENTINELA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA). COMUNIDAD DE MADRID. TEMPORADA 2025/2026. Datos hasta la semana 37 de 2026 (semana que finaliza el 13 de septiembre de 2026).

La pandemia de COVID-19 impulsó la necesidad de implantar un sistema para la vigilancia sindrómica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) con la finalidad de detectar y monitorizar la incidencia y características epidemiológicas y microbiológicas de la infección respiratoria producida por los patógenos circulantes en la comunidad (gripe, COVID-19 y VRS). A finales de 2020 la Comunidad de Madrid adaptó el Sistema de Vigilancia Centinela de la gripe y comenzó la vigilancia sindrómica de las IRA (SiVIRA-MAD). La vigilancia poblacional en tiempo real debe permitir la detección inmediata de cualquier virus respiratorio emergente en circulación para poner en marcha la respuesta más apropiada lo antes posible.

La vigilancia se lleva a cabo tanto en atención primaria (episodios de IRA), como en atención hospitalaria (ingresos urgentes por IRA). En atención primaria se recoge el número de episodios de sospecha o confirmados de IRA atendidos en consulta médica o telefónica registrados con los códigos CIAP R74 (infección respiratoria aguda del tracto superior), R76 (amigdalitis aguda), R77 (faringitis/traqueítis aguda), R78 (bronquitis, bronquiolitis aguda, Infección pulmonar aguda), R80 (gripe), R81.02 (neumonía viral), A77.01 (infección debida a coronavirus), A77 (sospecha de COVID-19). En atención hospitalaria la fuente de información son los ingresos urgentes diarios. Además, se recogen datos clínicos, de evolución, vacunales y antecedentes de riesgo y se lleva a cabo la toma de una muestra respiratoria de los episodios detectados un día a la semana para la identificación de SARS-CoV-2, Gripe, VRS y otros virus respiratorios.

En la temporada 2025-2026, la población vigilada en atención primaria asciende al 10% y está constituida por la población de referencia de 30 centros de salud. En atención hospitalaria la población vigilada es la población de referencia de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Ramón y Cajal, que cubren el 28,1% de la población.

En este informe se presenta la incidencia acumulada semanal de casos sospechosos de SARS-CoV-2, gripe y VRS correspondientes a la temporada 2025-2026, que abarca desde la semana 40/2025 (semana que comienza el 29 de septiembre) hasta la semana 39/2026.

#### Incidencia de infecciones respiratorias agudas

La incidencia de infecciones respiratorias agudas ha sido de **282,31** casos por 100.000 habitantes en **Atención Primaria** (248,43 en la semana anterior). La incidencia más alta se ha observado en menores de 5 años (1172,66 casos por 100.000). La incidencia en **Atención Hospitalaria** ha sido de **9,98** (8,70 la semana previa). El grupo de edad de mayor incidencia fue el de 80 o más años (94,68).

#### Incidencia de gripe

La incidencia de gripe en la semana 37 en **Atención Primaria** ha sido de **7,71** casos por 100.000 habitantes (6,2 la semana anterior). En **Atención Hospitalaria** se detectaron **0,39** casos sospechosos por 100.000 habitantes de gripe (0,39 casos la semana previa).

#### Incidencia de infección por SARS-CoV-2

La incidencia acumulada de casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2 durante la semana 37 ha sido de **29,2** en **Atención Primaria** (18,45 la semana previa). En **Atención Hospitalaria** se detectaron **1,52** casos esta semana (0,84 la semana previa).

#### Incidencia de bronquiolitis aguda en menores de 1 año


En **Atención Primaria**, en menores de 1 año durante la semana 37 se detectaron **21,42** casos por 100.000 habitantes, (21,42 la semana anterior). En **Atención Hospitalaria** se detectaron **14,47** casos sospechosos por 100.000 habitantes de bronquiolitis aguda (sin casos la semana previa).

## Infecciones respiratorias agudas


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




## Gripe


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




## Infección por SARS-CoV-2


## Incidencia semanal

● 2024-2025 ● 2025-2026

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




**Bronquiolitis aguda**

Incidencia semanal (menores de 1 año)

● 2024-2025 ● 2025-2026


Atención primaria

**Infecciones respiratorias agudas**


Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años

Atención primaria




Ingresos hospitalarios

**Gripe**


Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años

Atención primaria



Ingresos hospitalarios




## Infección por SARS-CoV-2


## Incidencia por grupo de edad (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● 0 a 4 años ● 5 a 14 años ● 15 a 64 años ● 65 a 79 años ● 80 o más años

## Atención primaria



## Ingresos hospitalarios




## Bronquiolitis aguda


## Incidencia por edad en niños menores de 5 años (8 últimas semanas)

Grupo de edad ● Menores de 1 año ● 1 año ● 2 años ● 4 años

## Atención primaria



## Ingresos hospitalarios



**4. BROTES EPIDÉMICOS. COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2026. Datos de la semana 37 de 2026 (del 7 al 13 de septiembre) y acumulado anual hasta la semana 37 de 2025 y 2026.**
**4.1.- Brotes notificados en la semana 37 de 2026.**

| Enfermedad                       | Ámbito                         | Nº Brotes | Observaciones/Actuaciones                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Covid-19</b>                  | Residencia de personas mayores | 2         | Apoyo al colectivo sobre medidas de control y seguimiento del brote de acuerdo al protocolo de vigilancia regional vigente                           |
| <b>Escabiosis</b>                | Residencia de personas mayores | 1         | Residentes; refuerzo de medidas higiénicas y tratamiento de casos y compañeros de habitación                                                         |
| <b>Gripe</b>                     | Residencia de personas mayores | 1         | Residentes; se indica quimioprofilaxis de contactos estrechos                                                                                        |
| <b>GEA de origen alimentario</b> | Domicilio particular           | 1         | <i>Salmonella sp</i> ; consumo de huevos rotos; no ingresos hospitalarios                                                                            |
| <b>GEA no alimentaria</b>        | Residencia de personas mayores | 2         | Sospecha de virus con transmisión persona a persona entre residentes de la misma planta; cuadros leves, sin ingresos; refuerzo de medidas higiénicas |
| <b>Mpox clado Ib</b>             | Social                         | 1         | Fiestas chemsex                                                                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                     | --                             | <b>8</b>  | --                                                                                                                                                   |

GEA: gastroenteritis aguda.

**4.2.- Brotes notificados hasta la semana 37 de 2025 y 2026 (excepto covid-19).**

|                                             | Año 2026   |              | Año 2025*  |              |
|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                             | Brotes     | Casos        | Brotes     | Casos        |
| Gastroenteritis aguda de origen alimentario | 83         | 1.220        | 72         | 786          |
| Gastroenteritis aguda no alimentaria        | 88         | 1.929        | 79         | 2.268        |
| Conjuntivitis                               | 4          | 36           | 1          | 16           |
| Enfermedad de mano, pie y boca              | 8          | 86           | 1          | 8            |
| Enfermedad invasiva por <i>S. pyogenes</i>  | 1          | 2            | 0          | 0            |
| Escabiosis                                  | 45         | 329          | 29         | 272          |
| Escarlatina                                 | 3          | 13           | 3          | 18           |
| Gripe                                       | 21         | 261          | 28         | 243          |
| Hepatitis A                                 | 10         | 21           | 20         | 42           |
| Impétigo                                    | 1          | 2            | 1          | 5            |
| Infección por virus respiratorio sincitial  | 2          | 10           | 2          | 10           |
| Infección respiratoria aguda sin filiar     | 1          | 20           | 0          | 0            |
| Legionelosis                                | 1          | 2            | 1          | 2            |
| Mpox                                        | 3          | 13           | 0          | 0            |
| Sarampión                                   | 8          | 29           | 0          | 0            |
| Tosferina                                   | 2          | 10           | 0          | 0            |
| Tuberculosis pulmonar                       | 20         | 45           | 25         | 61           |
| Varicela                                    | 5          | 25           | 3          | 22           |
| <b>Total</b>                                | <b>306</b> | <b>4.053</b> | <b>265</b> | <b>3.753</b> |

\*Sólo procesos que han presentado brotes en el año en curso.

Datos provisionales hasta el cierre anual de la información.

**4.3.- Distribución de los brotes más frecuentes según número de casos. Semanas 1 a 37 de 2026.**

|                           | Número de brotes según magnitud |                |                  |                |                 |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                           | De 2 a 3 casos                  | De 4 a 9 casos | De 10 a 49 casos | 50 o más casos | Total de brotes |
| GEA no alimentaria        | 1                               | 20             | 58               | 9              | 88              |
| GEA de origen alimentario | 35                              | 26             | 15               | 7              | 83              |
| Escabiosis                | 10                              | 22             | 13               | 0              | 45              |
| Gripe                     | 2                               | 5              | 14               | 0              | 21              |
| Tuberculosis pulmonar     | 19                              | 1              | 0                | 0              | 20              |
| Hepatitis A               | 10                              | 0              | 0                | 0              | 10              |
| Enf. mano, pie y boca     | 0                               | 4              | 4                | 0              | 8               |
| Sarampión                 | 6                               | 1              | 1                | 0              | 8               |

GEA: gastroenteritis aguda.

## 5. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID, VERANO 2026. Semana 37, datos a 15 de septiembre de 2026.




La vigilancia de los efectos en salud de las olas de calor tiene el objetivo de detectar cambios en la mortalidad y en la demanda asistencial urgente, integrando datos de dos subsistemas: el de información ambiental y el de vigilancia de la mortalidad y morbilidad en la Comunidad de Madrid (CM). Ello se contempla en el marco del [Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas 2026](#) que en su Capítulo 1 recoge la Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor en la salud. Responde a una de las actividades de la Comisión Técnica de Coordinación del Plan formada por distintas instituciones con el objetivo de armonizar las actuaciones y disminuir los efectos en salud asociados a las altas temperaturas.

La temporada de vigilancia se activa el día 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, un total de 124 días, desde la semana 20 a la 38. Sin embargo, en función de las variaciones imprevisibles y adelantadas o retrasadas de las elevadas temperaturas observadas, se considera un período de flexibilidad desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.

Los datos de mortalidad proceden del Registro General de Registros Civiles y Notarios del Ministerio de Justicia, facilitados por el Centro Nacional de Epidemiología (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, MoMo). Se incluyen los fallecimientos de los 21 municipios de la CM que disponen de Registro Civil. Se calcula el exceso de fallecimientos observados diarios y se comparan con los esperados, según el comportamiento de la mortalidad diaria, en estos mismos municipios, los 5 años anteriores (2021-2025).


Los gráficos representan la **mortalidad** diaria observada y esperada y límites superior e inferior (+3DE). Un segundo gráfico representa la mortalidad diaria y las **temperaturas** máxima del día anterior ( $T^{\text{mx}}$ ) y mínima del mismo día ( $T^{\text{mín}}$ ), señalando los niveles de alerta para cada una de las zonas Meteosalud (ZMS) de la CM. Por la alta correlación de los niveles diarios de **ozono troposférico** con las elevadas temperaturas y por sus efectos perjudiciales sobre la salud, ofrecemos el tercer gráfico con la mortalidad diaria y la concentración diaria máxima de este contaminante medida en alguna de las estaciones de la CM (Catálogo de Datos Abiertos de la CM), señalando los umbrales de contaminación que se contemplan en el Protocolo de actuación ante superaciones de umbrales de ozono de la CM. Los datos de **urgencias** atendidas proceden del CMBD de urgencias de 26 hospitales públicos, aportando el número diario y el porcentaje de urgencias ingresadas cada semana. También se ofrece información acerca de las urgencias hospitalarias atendidas relacionadas con las altas temperaturas. A partir de la descarga diaria de **Atención Primaria**, se aporta el número de consultas o episodios registrados con motivo en el descriptor clínico relacionado con las altas temperaturas, golpe de calor u otros.

### 5.1.- Mortalidad diaria, número total de fallecimientos observados y esperados, Comunidad de Madrid 2026.



\*Fuente: Datos procedentes del Registro General de Registros Civiles y Notarios, Ministerio de Justicia y Sistema MOMO, Centro Nacional de Epidemiología. Mortalidad esperada: elaboración propia a partir de datos de los cinco años anteriores (2021-2025), Unidad Técnica de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles.


## 5.2.- Mortalidad total diaria observada y temperatura máxima observada del día anterior y mínima del mismo día\*\*, Comunidad de Madrid 2026.



\*Líneas horizontales: temperatura de alerta en cada ZMS: 34,1°C, 35,3°C y 35,9°C.

\*\*Datos de temperatura: valores medios de las temperaturas máximas y mínimas diarias registradas en los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proporcionados por el Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales.

## 5.3.- Mortalidad total diaria observada y concentración máxima de ozono registrada el mismo día\*\*. Comunidad de Madrid 2026.



\*Líneas horizontales: umbrales de ozono troposférico: umbral de activación (160 µg/m³); umbral de información (180 µg/m³); umbral de prealerta (210 µg/m³) y umbral de alerta (240 µg/m³).


\*\*Concentración diaria máxima de ozono troposférico en promedio horario medida en alguna de las estaciones de la CM (Catálogo de Datos Abiertos de la CM).

- La **mortalidad** observada entre los días 15 de mayo y 7 de septiembre (semanas 20 a 37), fue de 12.975 fallecimientos observados, un 1,6% (N=206) mayor que los esperados (N=12.769). Desde el inicio de la temporada se ha superado el límite máximo de la mortalidad esperada (+3DE) en dos días: el día 30 de mayo (que superó el límite en 7 fallecimientos) y el 10 de julio (que superó el límite en 8 fallecimientos). A partir del día 23 de junio, se observa un ascenso notable en la mortalidad, sin alcanzar el límite superior esperado, coincidente con la primera ola de calor del verano. Este ascenso se ha mantenido durante las semanas 26 y 27 (del 22 de junio al 5 de julio), con el repunte posterior ya mencionado, del día 10 de julio, probablemente relacionado con la segunda ola de calor del verano. Entre el 11 y el 15 de agosto (semana 33) se observa un nuevo ascenso en la mortalidad, probablemente en relación con los episodios de altas temperaturas ocurridos durante la primera quincena de agosto. A partir del 1 de septiembre se aprecia un nuevo repunte de la mortalidad, en probable relación con la ola de calor que comenzó en esas fechas. Debido al retraso en la notificación, no están disponibles los datos con la mortalidad de la semana 37 completa. Los datos de los dos últimos meses se han adaptado para este informe a partir de las estimaciones del sistema MoMo.

- El número **total de urgencias hospitalarias atendidas** en la semana 37 fue de 68.473 (un 1,5% más que la semana anterior), de las que se procedió al ingreso hospitalario en un 8,1% (un 5,0% menor que la semana anterior). Estos datos son provisionales. Hasta este momento, las semanas 21 (del 18 al 24 de mayo) y 32 (del 3 al 9 de agosto) son las que han registrado un mayor porcentaje de ingresos. Desde el inicio de la temporada han sido 431 las **urgencias hospitalarias** atendidas en las que consta en el diagnóstico principal **causas relacionadas** con las altas temperaturas, como golpe de calor, agotamiento o fatiga, siendo la semana 26 (del 22 al 28 de junio) en la que un mayor número de episodios se atendió (N=60). El número de urgencias hospitalarias atendidas en la semana 37 por este motivo ha sido de 8 (similar a la semana anterior).
- Desde el inicio de la temporada de vigilancia, de la semana 20 a la semana 37 (hasta el 13 de septiembre) se han registrado en **Atención Primaria** un total de 1.590 consultas con algún descriptor clínico relacionado con las altas temperaturas: golpe de calor (N=1.139) u otros (N=451). La semana con mayor número de consultas de este tipo ha sido, hasta el momento, la semana 26 (22 a 28 de junio, N=250). En la semana 37 se registraron 46 consultas relacionadas con las altas temperaturas en Atención Primaria (un 48% más que la semana anterior).

**6. VIGILANCIA DE LAS ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS (EPC). COMUNIDAD DE MADRID****Datos del 1 al 31 de agosto 2026****Fuente: Sistema de información de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (VIRAS)****RESUMEN:**


- En el mes de agosto de 2026 se han registrado 142 casos nuevos de EPC.
- Por sexo, 91 casos (64,1%) son hombres. La edad media es de 69,3 años (DE: 20,2).
- Los casos infectados ascienden a 79 (55,6%). Los casos colonizados ascienden a 62 (43,7%), y en 1 caso el estado de portador es desconocido (0,7%).
- El microorganismo más frecuentemente aislado es *Klebsiella pneumoniae*, con 102 aislamientos (71,8%).
- Por tipo de carbapenemasa, OXA-48 es la más frecuente con 50 aislamientos (35,2%).

**6.1. Evolución del Nº de Casos de EPC por mes. Año 2026.**


\* Se actualizan los datos del mes previo en cada informe

**6.2. Descripción de EPC. Comunidad de Madrid. Distribución por edad y sexo. Agosto 2026.**


| Edad         | Hombres      | Mujeres      | Total         | %             |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-2          | 1            | 2            | 3             | 2,1%          |
| 3-19         | 4            | 0            | 4             | 2,8%          |
| 20-61        | 24           | 6            | 30            | 21,1%         |
| 62-75        | 29           | 11           | 40            | 28,2%         |
| 76-90        | 31           | 24           | 55            | 38,7%         |
| >90          | 2            | 8            | 10            | 7,1%          |
| <b>Total</b> | <b>91</b>    | <b>51</b>    | <b>142</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>%</b>     | <b>64,1%</b> | <b>35,9%</b> | <b>100,0%</b> |               |

**6.3. Tipo de muestra. Agosto 2026.**


## 6.4. Tipo de EPC. Agosto 2026.



## 6.5. Tipo de carbapenemasa. Agosto 2026.



## 6.6. Casos de infección-colonización por EPC según tipo de hospital. Agosto 2026.



## 6.7. Bacteriemias por EPC según tipo de hospital. Agosto 2026.

| Tipo de hospital          | Nº bacteriemias | Tasa bacteriemia/infecciones*100 |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Alta complejidad          | 4               | 5,1                              |
| Media complejidad         | 2               | 2,5                              |
| Baja complejidad          | 0               | 0                                |
| Otros hospitales públicos | 0               | 0                                |
| H. media/larga estancia   | 0               | 0                                |
| Hospitales privados       | 1               | 1,3                              |
| <b>Total</b>              | <b>7</b>        | <b>8,9</b>                       |