Comunidad de Madrid

Medios de Comunicación

El análisis ha sido realizado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública

La Comunidad de Madrid realiza un estudio que demuestra cómo la vacunación contra el COVID-19 reduce un 60% el riesgo de reinfección

- En la región se han registrado 42.291 casos de reincidencia, de los que el 90,4% pertenecen a la sexta ola
- La mayor parte se presentan de forma leve gracias a la eficacia de las vacunas y la inmunidad previa del paciente
- El 62,5% de las actuales reinfecciones se produce en enfermos no inmunizados o sin pauta completa

23 de enero de 2022.- La Comunidad de Madrid ha realizado un estudio que concluye que el riesgo de sufrir una reinfección por COVID-19 se reduce en casi el 60% (59,5%) si se está vacunado. El análisis de situación ha sido desarrollado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.

Este departamento ha registrado, desde el 29 de diciembre del año 2020 y hasta mediados del presente mes de enero, un total de 42.291 reinfecciones. De este cómputo, el 90,4% pertenece a la sexta ola (que comienza a considerarse así desde el pasado 18 de octubre).

Aunque durante este periodo epidemiológico el riesgo de reincidencia aumenta 7,5 veces respecto al anterior -quinta ola-, la mayor parte de los casos analizados actualmente cursan con formas leves, gracias a que el estado inmunitario de la persona se encuentra más protegido (al haber estado ya en contacto con el virus), y especialmente debido a la protección que ofrecen las vacunas. En este sentido, los epidemiólogos insisten en que la inmunización evita formas graves de enfermedad y, aunque no impiden la transmisión, sirven para disminuir la infección y la reinfección.

En el 99,6% de los casos totales de reinfección (42.291) la persona ha pasado la enfermedad dos ocasiones, mientras que tan solo 117 (0,42%) lo han sufrido una tercera vez. Además, el estudio revela que la mayoría de estas reincidencias se han producido en la citada sexta ola, y el 62,5% de los afectados no estaban vacunadas o solo contaban con una dosis.