

# 2018

Mariposa del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

## Tomares ballus (Fabricius, 1787)



**RESERVA NATURAL**  
**EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA**  
*Mariposas diurnas*



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO			■									
ORUGA			■	■	■							
CRISÁLIDA					■	■	■	■	■	■	■	■
IMAGO		■	■	■								

### ¿Cómo es?

Los machos tienen el anverso de las alas de color gris muy oscuro con fimbrias algo más claras y de 1 a 3 manchas naranjas subterminales (a veces ausentes) mientras que, las hembras, presentan extensas áreas de un vivo color naranja en la base de las anteriores y en posición submarginal en las posteriores. El reverso de las alas anteriores, en ambos sexos, es anaranjado, con gruesos puntos negros; el reverso de las posteriores es verde azulado con el borde anaranjado. Las **orugas** en su estado juvenil tienen el dorso amarillento con verrugas de las que salen recias quetas largas de color blanco y cortas de color negro. En estos primeros estadios la cabeza y las patas son negras. Cuando son adultas son amarillas, con la línea dorsal castaño- violácea sobre manchas pardas más claras. Presentan una hilera de verrugas amarillas a ambos lados de la línea mediano-dorsal, de la que emergen recios pelos cortos. En su último estadio la cabeza y patas son de color pardo. Las **crisálidas** son cortas y gruesas, de superficie rugosa y con las líneas segmentarias bien marcadas.

### ¿Dónde podemos encontrarla?

*Tomares ballus* tiene una distribución que va desde el norte de África, centro y sur de España y hasta el sur de Francia. En el sur de la Comunidad de Madrid la podemos encontrar en la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola y el Parque Regional del Sureste.

### ¿Cuál es su hábitat?

En la Comunidad de Madrid no es demasiado abundante y parece mostrar ciertas preferencias por los coscojares de las mesas del Sudeste. El coscojar constituye por sí mismo un matorral denso e intrincado, con una altura considerable que en algunos casos supera los 2 m y un porte en volumen muy importante, que se mantiene verde todo el año. Esta comunidad ocupa las laderas soleadas en suelos aluviales calizos, mientras que en áreas abarrancadas, donde la erosión es acuciante, y terrenos yesosos, prefiere una exposición umbrófila.

### ¿Grado de protección?

Cada vez se hace más raro ver algún imago volar y más difícil todavía encontrar sus orugas. Aunque es una mariposa bastante escasa no goza de ninguna protección.

### ¿Sabías qué?

Es una de las primeras mariposas diurnas (Ropalóceros) que aparece más temprano en escena, algunas lo hacen incluso en un mes tan frío como febrero; se posan sobre el suelo para calentarse al débil sol del final del invierno, y realizan cortos vuelos a ras del suelo.

### ¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas se alimentan de las hojas y flores de plantas herbáceas como es el caso del trébol de cuernos (*Lotus corniculatus*), trébol común (*Trifolium pratense*), trébol blanco (*Trifolium repens*) y astrágalo (*Astragalus glaux*). También de *Astragalus lusitanicus* y *Trifolium cherleri* (MUNGUIRA *et al.*, 1997). Otras plantas citadas son *Medicago polymorpha* y *Ornithopus compressus* (JORDANO *et al.*, 1989).

Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola. Subdirección General de Espacios Protegidos. Comunidad de Madrid.

