

Calandino

Squalius alburnoides

Rutilus o *Leuciscus* o *Tropidophoxinellus* - *alburnoides* (Steindachner 1866)

Fam CYPRINIDAE



rínidos



• Descripción:

- Cuerpo: Fusiforme, alargado < 13 cm (raramente hasta 18 cm). Pedúnculo caudal muy estrecho.
- Línea dorsal negra, muy marcada, con 40-45 escamas curvada por el dorso.
- Cabeza: Algo puntiaguda, de perfil superior recto.
- Boca no bajo el hocico, largo arqueada. SIN barbillones.
- Color: Vientre plateado, dorso grisáceo azul metálico.
- Aletas: Dorsal justo detrás de las ventrales.
- Algunas diferencias con:
 - * Alburno: Aleta anal 7 radios NO 17.
 - * Bermejuela: NO aletas rojizas.
 - * Pardilla: Menos de 55 escamas (nunca más) de mayor tamaño.
 - * Cacho: Boca algo hacia arriba. Escamas de borde oscuro.

• Habitat:

- Abunda en los tramos medios y bajos de ríos no muy caudalosos y en embalses.
- Prefiere las aguas claras, tranquilas, oxigenadas y puras.
- Comportamiento muy gregario.

• Reproducción:

- En abril y mayo entre herbazales y piedras a poca profundidad.

• Alimentación:

- Bastante omnívoro, sobre todo algas e invertebrados.

• Distribución geográfica:

- Endemismo de la Península Ibérica. Por las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
- Manzanares, Henares, Jarama, Guadarrama, Lozoya y Alberche.

• Protección:

- Anejo III C. Berna,
- II D. Habitat.
- Peligro de extinción en CREA-Madrid.

