

2024

Mariposa del mes

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

Eudonia angustea (Curtis, 1827)



PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA

Mariposas nocturnas



| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HUEVO | | | | | | | | | | | | |
| ORUGA | | | | | | | | | | | | |
| CRISÁLIDA | | | | | | | | | | | | |
| IMAGO | | | | | | | | | | | | |

¿Cómo es?

Eudonia angustea es una mariposa de pequeño tamaño, con una envergadura alar entre 17 y 22 milímetros. Alas anteriores estrechas, con el ápice agudo y de colores grises y pardos con un dibujo jaspeado que consiste en zonas blanquecinas, mezcladas con otras pardas y salpicadas de negro; base más oscura; líneas blanquecinas, de bordes oscuros, la primera oblicua y la segunda sinuada; orbicular delineada de negro; negro claviforme, tocando la primera línea; una marca discal negra en forma de "x", la mitad superior de color marrón claro; línea subterminal turbia, blancuzca, junto a la segunda. Las alas posteriores son de color gris blancuzco, más oscuras en el área terminal.

La oruga tiene pelos finos, cortos y dispersos; es de color gris negruzco a castaño o pardo anaranjado, ligeramente teñida de verdoso; manchas más oscuras o casi negras; cabeza marrón pálido.

¿Dónde podemos encontrarla?

Esta especie coloniza la mayor parte de Europa, norte de África y Turquía. También en las islas Canarias y Madeira. En la península ibérica está repartida por toda la geografía. Tanto en Madrid como en el Parque Regional del Sureste es frecuente.

¿Cuál es su hábitat?

Esta especie, que pertenece a la familia Crambidae, vive en áreas donde hay musgo en el suelo o en piedras, rocas y muros, por lo que no tiene una preferencia concreta en cuanto a los ecosistemas que habita. No está claro cuántas generaciones puede tener en un año. Algunos autores sugieren que posiblemente sea solo una, ya que la polilla adulta hiberna y se puede ver durante todos los meses del año, mientras que no se ven orugas en invierno ni en primavera, pero otros expertos indican que lo más probable es que sean dos, aunque también se sugiere incluso tres dependiendo de los lugares donde habita y las condiciones climatológicas.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas de *Eudonia angustea* se alimentan de musgos. Las larvas tejen tubos de seda a través de las especies de musgo de las que se alimentan.

¿Grado de protección?

Eudonia angustea carece de protección porque no la necesita. Las poblaciones madrileñas se mantienen estables y, en principio, no existen más factores de riesgo para su supervivencia que la pérdida de hábitat, los causados por los herbicidas e insecticidas empleados en la agricultura y los derivados de la contaminación lumínica, puesto que, como muchas otras especies de la familia, son fuertemente atraídas por las luces durante la noche.

¿Sabías que?

La familia Crambidae comprende unas 10.000 especies en el mundo. En la península ibérica vuelan alrededor de 260 especies de crámbidos, repartidas en 90 géneros, de las cuales una quincena son endemismos (Revilla, 2024). Incluye varias especies que producen importantes daños económicos, entre ellas, *Chilo suppressalis* (Walker, 1863), una plaga del arroz y *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796), que perjudica al maíz.

En algunos países, varias especies de esta familia se emplean como controladores biológicos para combatir ciertas plantas introducidas que se han convertido a su vez en especies invasoras.