

2024

Planta del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							JUL					



Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS		■	■	■	■	■	■					
FLORES				■	■	■	■					
FRUTOS						■	■					

¿Cómo es?

Hainardia cylindrica es una planta herbácea, anual, de 30 a 60 centímetros de altura. **Tallos** erectos o geniculado-ascendentes, glabros, por lo general fasciculados y ramificados en la base. **Hojas** con lígula de 0,4-0,8 mm, glabra; limbo de hasta 20 cm x 4 mm, con nervios escábridos en el haz. **Espigas** poco curvadas; espiguillas laterales con una sola gluma. Espiga de hasta 22 cm, recta, con eje grueso y hasta 45 espiguillas. Gluma de 5-8,5 mm, con nervios bien marcados, margen escarioso estrecho y un surco transversal en la base. glumilla inferior con el dorso hacia el eje de la espiga. Lema de 4,2-6 mm, más corta que la gluma, con nervios laterales cortos y poco marcados. Pálea tan larga o algo más larga que la lema. Anteras de 1,8-2,1 mm.

¿Dónde podemos encontrarla?

Originaria del Mediterráneo; coloniza las regiones Mediterránea (excepto Egipto) e Irano-Turánica, Macaronesia y suroeste de Asia. Introducida en diversas partes del mundo: Norte y sur de América, sur de África y Australia. Dispersa en la península ibérica, aunque extendida prácticamente por todas las provincias. En la Comunidad de Madrid es más frecuente hacia el sur y sureste. En el Parque Regional del Sureste también está representada, sobre todo en los municipios del sur.

¿Cuál es su hábitat?

Hainardia cylindrica vive en herbazales higrófilos y marjales, saladares y enclaves temporalmente inundados, con preferencia por los suelos arcillosos ricos en sales, tanto en el litoral como en el interior.

¿Sabías que?

El género *Hainardia* Greuter es monotípico (solamente tiene una especie, la que nos ocupa) y fue nombrado en honor de P. Hainardi, fitogeógrafo y colega de Greuter. La especie fue descrita por el ilustre botánico alemán Carl Ludwig Willdenow (Berlín, 22 de agosto de 1765 – Berlín, 10 de julio de 1812), considerado uno de los fundadores de la Fitogeografía, y ubicada en el nuevo género *Hainardia* por el botánico y también profesor universitario como aquel, Werner Rodolfo Greuter, genovés nacionalizado suizo, muy conocido por ser catedrático del Comité Editorial del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (ICBN).

Dentro de la clase *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937, en los caminos costeros es una planta característica de los pastizales de senderos con suelo más o menos arenoso en ambiente forestal (*Lolio perennis-Plantaginion majoris* Sissingh 1969), mientras que en el sur de Madrid y norte de Toledo se ha registrado, también en esa clase, en herbazales higrófilos con suelos arcillosos.

Esta especie hibrida ocasionalmente con *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb., una especie que también vive en Madrid y que guarda un gran parecido con *Hainardia cylindrica* pero presenta casi siempre espigas curvadas y el número de glumas puede ser 1 o 2. No obstante, aquí no se han detectado tales híbridos (si en cambio en Huelva y Sevilla), denominándose el mentado híbrido x *Hainardiopholis pauneroi* Castrov. 1980 o *Parapholis x pauneroi* (Castrov.) Romero Zarco 2015.



¿Grado de protección?

El *balliquillo*, especie de la familia Poaceae, carece de protección porque no la necesita. Por otra parte, las poblaciones que se localizan dentro de los límites del PRS están protegidas por la legislación que regula este espacio. La mayor amenaza para la especie es la pérdida de hábitat.



Parque Regional del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Flora