

7.2.23. Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer en hombres muestra similar mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro de la capital destaca el distrito de Villa de Vallecas. Fuera del municipio de Madrid destacan con mayor mortalidad los municipios de Parla, Rivas-Vaciamadrid y Fuenlabrada.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por enfermedad de Alzheimer en hombres se asocia con la privación económica, observándose un gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta. Así, el riesgo de muerte es un 36% mayor en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.11	1.06-1.16
Q3	1.23	1.18-1.29
Q4	1.17	1.12-1.23
Q5	1.36	1.30-1.42

■ Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.24. Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer en mujeres muestra mayor mortalidad fuera del municipio de Madrid que en la capital.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro de la capital destaca la mortalidad de los distritos municipales de Barajas y San Blas. Fuera de Madrid destacan Parla, Valdemoro, Tres Cantos y Collado Villalba con la mayor mortalidad.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por enfermedad de Alzheimer en mujeres no muestra clara asociación con la privación económica, aunque sugiere una relación inversa.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.99	0.86-1.14
Q3	0.93	0.81-1.08
Q4	0.82	0.71-0.96
Q5	0.85	0.73-1.00

■ Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.