

7.2.3. Mortalidad por cancer de esófago, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de esófago en hombres muestra mayor mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Puente de Vallecas, Retiro, Tetuán y Moratalaz donde se observa agregación de exceso de mortalidad. Fuera del municipio de Madrid destaca con la mayor mortalidad el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de esófago en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta la privación socioeconómica. Así, el riesgo de muerte es un 81% superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.35	1.10-1.65
Q3	1.29	1.05-1.59
Q4	1.53	1.25-1.89
Q5	1.81	1.50-2.25

■ Mortalidad por cáncer de esófago, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de esófago, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.