

7.2.4. Mortalidad por cáncer de estómago, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).



Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.12	0.97-1.28
Q3	1.34	1.18-1.52
Q4	1.39	1.23-1.59
Q5	1.49	1.32-1.70

Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de estómago en hombres no muestra diferencias importantes en el municipio de Madrid frente al resto de la Comunidad.



Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Vicálvaro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, y Usera. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios de Parla, Leganés, Rivas-Vaciamadrid, Alcorcón y Getafe.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de estómago en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta la privación socioeconómica. Así, el riesgo de muerte es un 49% mayor en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

■ Mortalidad por cáncer de estómago, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de estómago, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.5. Mortalidad por cáncer de estómago, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de estómago en mujeres muestra predominio en las secciones censales de fuera del municipio de Madrid.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Villaverde, Usera, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios de Getafe, Leganés, Alcorcón, Alcalá de Henares y Pinto.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de estómago en mujeres se asocia con la privación económica, observándose un gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que empeora. Así, el riesgo de muerte es un 32% mayor en quintil más desfavorecido respecto al de mejor situación.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.05	0.90-1.23
Q3	1.16	0.99-1.36
Q4	1.18	1.01-1.38
Q5	1.32	1.15-1.56

■ Mortalidad por cáncer de estómago, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de estómago, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.