

7.2.9. Mortalidad por cáncer de laringe, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de laringe en hombres muestra pocas diferencias entre el municipio de Madrid y el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Carabanchel, Villaverde, Puente de Vallecas, Usera, Latina, Centro, Arganzuela, Villa de Vallecas. Fuera del municipio de Madrid destaca con la mayor mortalidad los municipios de Getafe y Fuenlabrada.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de laringe en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta la privación socioeconómica. Así, el riesgo de muerte es 2,54 veces superior en el quintil con peor situación respecto al de mejor situación socioeconómica.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.38	1.09-1.72
Q3	1.69	1.36-2.11
Q4	2.01	1.65-2.51
Q5	2.54	2.10-3.16

■ Mortalidad por cáncer de laringe, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de laringe, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.