

7.2.13. Mortalidad por cáncer de próstata, hombres, 2001-2007

Figura 1: RR^{**} por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de próstata presenta pocas diferencias entre el municipio de Madrid y el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid destaca el distrito de Chamberí y fuera de la capital destaca el municipio de Pozuelo de Alarcón con mayor mortalidad.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de próstata en hombres se asocia con la privación económica, observándose un riesgo de muerte un 10% mayor en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RR^{**} por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.






Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.16	1.13-1.19
Q3	1.13	1.11-1.16
Q4	1.06	1.03-1.08
Q5	1.10	1.07-1.13

■ Mortalidad por cáncer de próstata, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de próstata, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.