

7.2.14. Mortalidad por cáncer de vejiga, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).



Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.99	0.87-1.14
Q3	1.0	0.87-1.14
Q4	1.20	1.06-1.38
Q5	1.20	1.06-1.39

Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de vejiga en hombres muestra mayor mortalidad en el municipio de Madrid que en el resto de la Comunidad.



Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro, Centro, Retiro y Arganzuela. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios de Parla y Rivas-Vaciamadrid.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de vejiga en hombres se asocia con la privación económica, observándose un incremento a medida que aumenta la privación socioeconómica. Así, el riesgo de muerte es un 20% superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

■ Mortalidad por cáncer de vejiga, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de vejiga, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.15. Mortalidad por cáncer de vejiga, mujeres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por cáncer de vejiga en mujeres muestra pocas diferencias entre el municipio de Madrid y el resto de la Comunidad.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Barajas, Moratalaz, Retiro, Vicálvaro y Puente de Vallecas. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios de Parla y Getafe.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por cáncer de vejiga en mujeres no muestra asociación con la privación socioeconómica.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.03	0.79-1.32
Q3	0.95	0.74-1.23
Q4	0.89	0.69-1.16
Q5	0.95	0.75-1.24

■ Mortalidad por cáncer de vejiga, mujeres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por cáncer de vejiga, mujeres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.