

7.2.29. Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias, inferiores (excepto asma), hombres, 2001-2007

Figura 1: RR^s** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por bronquitis crónica en hombres muestra mayor mortalidad fuera del municipio de Madrid que en la capital.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, San Blas, y Centro. Fuera del municipio de Madrid destacan con mayor mortalidad los municipios de Fuenlabrada, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Parla, Aranjuez y Arganda del Rey.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por bronquitis crónica en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que empeora. Así, el riesgo de muerte es dos veces superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RR^s** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	1.35	1.23-1.49
Q3	1.57	1.43-1.74
Q4	1.78	1.63-1.97
Q5	2.01	1.84-2.24

■ Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma), hombres, 2001-2007. Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma), hombres, 2001-2007. Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.

7.2.30. Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias, inferiores (excepto asma) mujeres, 2001-2007

Figura 1: RR^s** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por bronquitis crónica en mujeres muestra mayor mortalidad fuera del municipio de Madrid que en la capital.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid los distritos municipales con mayor mortalidad son Centro, Retiro y Chamberí. Fuera del municipio de Madrid destacan con la mayor mortalidad los municipios San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Aranjuez y Parla.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por bronquitis crónica en mujeres no muestra una clara asociación con la privación económica, observándose un efecto protector en el segundo quintil de privación respecto al primero, y un aumento del riesgo para el resto de quintiles sin alcanzar la significación estadística.

Figura 2: RR^s** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.85	0.73-0.98
Q3	0.88	0.75-1.02
Q4	0.93	0.80-1.09
Q5	0.97	0.84-1.15

■ Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma), mujeres, 2001-2007. Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma), mujeres, 2001-2007. Probabilidad posterior RR*s*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.