

احمي طفلك

من التهاب القصيبات والتهابات
الجهاز التنفسي الأخرى

حملة التحصين في مواجهة فيروس
المخوي التنفسي



حملة التحصين في مواجهة فيروس المخلوي التنفسي

أطلق مجتمع مدريد في أكتوبر 2024 الحملة الثانية لتحصين الأطفال حديثي الولادة السبب الرئيسي للتهاب، (VRS) والرضع ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي القصبية

كيف يمكننا تجنب الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي VRS؟

من خلال التحصين بعقار نيرسيفيماب (بيفورتوس) nirsevimab (Beyfortus®). بإستخدام هذا الدواء يتم حقن الأجسام المضادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي VRS لعرقلة نشاطه.

يتم إعطاؤه عن طريق حقنة واحدة تحمي، على الأقل لمدة 5 أشهر، و تغطي الفترة التي تكون فيها العدوى أكثر شيوعاً (ما بين أكتوبر و مارس). تعتمد الجرعة على وزن الطفل .

هل له آثار جانبية؟

هذا الدواء له ملف أمان جيد للغاية الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي الطفح الجلدي قد يحدث ما يصل إلى 2 أسابيع بعد تناوله، والحمى والألم في موقع الحقن

أين سيتم إعطاؤها؟

تعطى في مراكز الولادة، قبل الخروج منها، للرضع المولودين ما بين 1 أكتوبر 2024 و 31 مارس 2025، المقيمين في مقاطعة مدريد .

إبتداءً من أكتوبر 2024، سيتم توفيرها بعد حجز الموعد ذاتياً، في تسعة مستشفيات كمومية بمقاطعة مدريد للأطفال المولودين ما بين 1 أبريل و 30 سبتمبر 2024

(VRS) ما هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي؟

إنه فيروس موسمي ينتشر، بشكل مبدئياً، ما بين أكتوبر و مارس .

يسبب التهابات بالجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال دون السن الثانية و يعتبر السبب الرئيسي في التهاب القنطرة الهوائية الصغيرة (البرونكيوليتيس) وهو عدوى الجهاز التنفسي الذي يؤثر على أصغر المسالك الهوائية ويمكن أن يسبب مخاط بالأنف، صعوبة في التنفس و صفير وشرخ في الصوت عند التنفس . عدوى الفيروس المخلوي هو موضوع عدد كبير من الإستشارات الطبية في مراكز الرعاية الأولية و المستعجلات . يكون الأطفال المبتسرون والرضع أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات . الأطفال الذين يعانون من أمراض الرئة أو أمراض القلب المزمنة أو بعض أنواع نقص الجهاز المناعي..

للمزيد من المعلومات :

<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/virus-respiratorio-sincitial-vrs>

يمكن مناقشة أي مشاكل صحية تظهر بعد إعطاء هذا الدواء مع طبيب الأطفال . بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك الإبلاغ مباشرة عن الأحداث www.notificaram.es السلبية المتعلقة بهذا الدواء على