


*Amanita ponderosa* Malençon & R. Heim



Gurumelo

© Juan Carlos Zamora


*Amanita ponderosa* Malençon & R. Heim



Gurumelo

© Juan Carlos Zamora

*Amanita verna* (Bull.) Lam. s.l.



Gurumelo

© Juan Carlos Zamora

Cicuta blanca, oronja blanca

|                      | <i>Amanita ponderosa</i>   | <i>Amanita verna</i><br>(incluida <i>Amanita decipiens</i> )  |
|----------------------|--|---|
| <b>Sombrero</b>      | Se mancha claramente con la manipulación de color crema rosado, luego pardo rosado   | Apenas se mancha con la manipulación  |
| <b>Pie</b>           | Robusto, con escamas que oscurecen, no bulboso   | Delgado, siempre blanco, bulboso  |
| <b>Anillo</b>        | Algodonoso, muy frágil, fugaz  | Membranoso, persistente   |
| <b>Carne</b>         | Abundante, a menudo más ancha que las láminas en el sombrero. Olor terroso. Blanca, rosea débilmente   | Poco abundante, a menudo más estrecha que las láminas en el sombrero. Olor débil, ácido. Blanca, sin cambios de color |
| <b>Observaciones</b> | Aunque el porte, carnosidad, cambios de coloración, volva y anillo son buenos caracteres diferenciales, ejemplares jóvenes y robustos de <i>A. verna</i> pueden crear confusión, especialmente si están muy manoseados. La volva de <i>Amanita ponderosa</i> suele ser mucho más gruesa y resistente que la de <i>A. verna</i> . Ambas tienen un hábitat similar. <i>Amanita curtipes</i> se confunde fácilmente con <i>A. ponderosa</i> , aunque la primera tiene menor porte, olor más débil y láminas más separadas, siendo también comestible (no comercializable) pero de peor calidad. Nota: La mancha amarilla del sombrero de <i>A. verna</i> se debe a la reacción al KOH (potasa) que identifica a <i>A. decipiens</i> , única forma de diferenciar ambas especies o variedades. (Ver observaciones de <a href="#">A. verna</a> y <a href="#">A. decipiens</a> en página 143). |   |



