

Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.



© José Félix Mateo

Seta de ardilla, seta de marzo

Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon



© Gabriel Moreno

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	<i>Hygrophorus atramentosus</i>	<i>Hygrophorus camarophyllus</i>
Sombrero	De 4-12 cm de diámetro, sin fibrillas oscuras	De 4-7 cm de diámetro, con fibrillas radiales oscuras	De 3-12 cm de diámetro, sin fibrillas radiales oscuras
Láminas	Blancas, grisáceas en la madurez	Generalmente blanquecinas	Blanquecinas a grisáceas o amarillentas, rosadas en la var. <i>calophyllus</i>
Pie	Blanquecino a oscuro en la madurez	Grisáceo fibrilloso desde el inicio	Pardo fuliginoso, como el sombrero
Época	Finales del invierno a primavera	Otoño	Mediados de verano a finales de otoño
Observaciones	<i>Hygrophorus marzuolus</i> se caracteriza por el sombrero de color gris negruzco en la madurez, sin fibrillas radiales, por las láminas y pie blanquecinos que se vuelven grisáceos con la madurez y por fructificar con el deshielo desde el mes de marzo (incluso desde enero en cotas bajas). <i>Hygrophorus atramentosus</i> e <i>Hygrophorus camarophyllus</i> son especies próximas, comestibles de menor calidad, no comercializables, escasas, que fructifican en los pinares de montaña.		