

*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst. (= *L. luscina sensu auct.*)



Seta de brezo

© Gabriel Moreno

*Clitopaxillus alexandri* (Gillet) G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado



Seta de carrasca

© Gabriel Moreno

*Clitocybe phyllophila* (Pers.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Lepista panaeolus</i>	<i>Clitopaxillus alexandri</i>	<i>Clitocybe phyllophila</i>
<b>Sombrero</b>	Gris a gris parduzco con máculas más oscuras y concéntricas, margen no incurvado	Gris a gris parduzco con máculas más oscuras y concéntricas, margen incurvado	Blanquecino sin máculas oscuras, pero por ser higrofano en ocasiones presenta marcas concéntricas de aspecto marmóreo, margen incurvado
<b>Láminas</b>	Sinuadas a subdecurrentes, de color crema a pardo claro	Decurrentes, de color crema a pardo claro	Sinuosas, poco decurrentes, primero blancas y luego beige
<b>Pie</b>	Parduzco sin mantener restos de humus adheridos en la base	Blanquecina con restos de humus adheridos en la base	Blanquecino con restos de humus adheridos en la base
<b>Olor</b>	Harinoso	Peculiar, pero no harinoso	Dulzón o herbáceo a algo espermático
<b>Observaciones</b>	<i>Lepista panaeolus</i> es una especie de prados que crece formando corros de brujas, con manchas oscuras concéntricas en el sombrero. <i>Clitopaxillus alexandri</i> es parecido, fructifica en bosques (encinares y pinares principalmente) y es también comestible, aunque apenas se consume y no se puede comercializar. <i>Clitocybe phyllophila</i> es también una especie de prados, tóxica, sin máculas concéntricas.		