

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.



Criadilla, criadilla rosada, turma, nacida
© Miguel Ángel Ribes y Javier Marcos

Choiromyces meandriformis Vittad.



Trufa de los cerdos, trufa de los meandros
© Fernando Rodríguez

Tuber borchii Vittad.



Trufa blanca, trufa de marzo
© Ita Paz

	<i>Rhizopogon roseolus</i>	<i>Choiromyces meandriformis</i>	<i>Tuber borchii</i>
Superficie	Amarillenta rosada, finalmente pardo ocráceo rojizo, a menudo cuarteada. Vinosa al roce. Con rizomorfos sólo en la base	Ocre marrón rojizo. Sin rizomorfos	Blanca marrón claro con manchas rojizas. Sin rizomorfos
Gleba	Blanca a amarilla ocrácea de joven, luego verde oliváceo al madurar	Marrón claro	Marrón claro
Olor	Agradable, algo afrutado	Complejo, fétido al madurar	Ligeramente a ajo
Observaciones	La comparativa entre <i>Rhizopogon roseolus</i> y <i>Tuber borchii</i> (u otras trufas verdaderas), ambas comestibles comercializables, se hace obligatoria por la diferencia de calidad y de precio entre ambas, siendo muy superior en las trufas.		