

Terfezia arenaria (Moris) Trappe



© Ita Paz Criadilla de tierra, patata de tierra, turma

Terfezia extremadurensis Muñ.-Mohedano, Ant. Rodr. & Bordallo



© Ita Paz

Tirmania nivea (Desf.) Trappe



© Ita Paz

	<i>Terfezia arenaria</i>	<i>Terfezia extremadurensis</i>	<i>Tirmania nivea</i>
Superficie	Blanco sucio a pardo oscuro	Ocre	Blanco a amarillento con tonos rojizos
Gleba	En tonos rosáceos	Gris con tonos verdes, recuerda al género <i>Tuber</i>	Rosácea
Olor	Agradable, suave	Agradable, muy suave	Muy débil
Esporas	Globosas de 24-32 µm	Globosas de 20-28 µm	Subglobosas y lisas de 12-19 x 10-16 µm
Observaciones	No es fácil diferenciar macroscópicamente especies de <i>Terfezia</i> , <i>Tirmania</i> o géneros similares, por lo que aportamos datos sobre sus esporas. <i>T. arenaria</i> se recolecta en la mitad sur de la Península Ibérica y recientemente se ha comenzado con su cultivo, denominándose turmicultura. Se suele recolectar con la ayuda de un pincho, práctica poco recomendable, ya que se recolectan ejemplares completamente inmaduros sin olor ni sabor. Tanto <i>Terfezia extremadurensis</i> , especie creada en 2013, como <i>Tirmania nivea</i> , son especies comestibles, pero no comercializables.		