

***Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini** (\equiv *Boletus lupinus* Fr.)



Boleto de lobo

© Juan Carlos Campos

***Butyriboletus pseudoregius* (Hubert) D. Arora & J.L. Frank** (\equiv *Boletus pseudoregius* Hubert ex Estadés)



© Miguel Ángel Ribes

***Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini** (\equiv *Boletus lupinus* Fr.)



Boleto de lobo

© José Félix Mateo

	<i>Rubroboletus lupinus</i>	<i>Butyriboletus pseudoregius</i>
Sombrero	Variable, sobre todo con tonos rosados, anaranjados a rojizos	Rosa sucio a pardo
Poros	Amarillo anaranjados que acaban rojizos. Azulean a la presión o al roce	Amarillentos, oliváceos en la madurez. Al roce verde azulados
Pie	Más o menos cilíndrico, atenuado en la base, de color amarillo con tonos más rosados u ocre en la base. Liso a ligeramente granulado	Cilíndrico a claviforme, de color amarillo con tonalidades rojizas en la zona central y basal. Retículo bastante marcado, del mismo color que el pie
Carne	Amarilla, en la base más rosada. Azulea al corte, menos en la base del pie	Amarillo pálido con tonos rosados en la base. Azulea al corte, sobre todo en el sombrero
Observaciones	Ambas especies se diferencian bastante bien por el color de los poros (naranja en <i>Rubroboletus lupinus</i> y amarillos en <i>Butyriboletus pseudoregius</i>), la ornamentación del pie (liso a granulado en <i>R. lupinus</i> y con retículo en <i>B. pseudoregius</i>) y el cambio de color de la carne al corte. <i>Butyriboletus pseudoregius</i> , aunque buen comestible, es una especie rara y no comercializable. No se conocen casos concretos de intoxicación por <i>R. lupinus</i> , pero por su parecido con otros <i>Boletus</i> tóxicos, se desaconseja su consumo.	