

Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm.



© Nino Santamaría

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© Nino Santamaría y Miguel Ángel Ribes

Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.



Seta de cunetas

© Nino Santamaría

	<i>Clitocybe dealbata</i>	<i>Clitocybe rivulosa</i>	<i>Marasmius oreades</i>
Sombrero	Convexo a aplanado, de color blanco crema, con aspecto glaseado o escarchado con la humedad	Convexo a aplanado, de color blanco crema, con aspecto glaseado o escarchado con la humedad	Acampanado a aplanado mamelonado, de color canela en húmedo a crema ocráceo al secarse
Láminas	Subdecurrentes, blancas, apretadas	Subdecurrentes, blancas, apretadas	Libres, de color crema, separadas
Pie	Frágil, se rompe si se retuerce	Frágil, se rompe si se retuerce	Tenaz, elástico, no se rompe si se retuerce
Olor	Herbáceo	Herbáceo	Ciánico, de almendras amargas
Observaciones	<i>Clitocybe dealbata</i> y <i>Clitocybe rivulosa</i> son considerados sinónimos por muchos autores. Ambas son tóxicas y producen una intoxicación neurovegetativa (síndrome micocolinérgico, muscarínico o sudoriano). <i>Marasmius oreades</i> , un buen comestible y comercializable, se distingue bien por su olor ciánico, su pie tenaz que resiste la torsión y la separación de las láminas.		

Senderuela, seta de carrerilla