

Entoloma vernum S. Lundell



© Fermín Pancorbo

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© Enrique Rubio

Senderuela, seta de carrerilla

Entoloma vernum S. Lundell



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Entoloma vernum</i>	<i>Marasmius oreades</i>
Sombrero	Primero cónico, luego se expande, pardo grisáceo, higrófono, al secarse palidece a gris ceniciento en bandas radiales	Convexo con mamelón central, crema parduzco, higrófono, estriado en el margen
Láminas	De color pardo grisáceo, con reflejo rosado en la madurez	Espaciadas, de color blanco cremoso
Carne	Fibrosa, del mismo color que el sombrero, olor poco notable	Cartilaginosa y elástica, olor aromático con reflejo cianico (almendras amargas) o de heno
Pie	De color similar al sombrero, ensanchado en la base, a veces algo comprimido con un surco longitudinal, pronto hueco y fistuloso, frágil	De color similar al sombrero. Macizo, duro y elástico. Se puede retorcer sin romper
Hábitat	Exclusivamente primaveral, en bosques de coníferas, especialmente de montaña	Todo el año en prados en corros de brujas, en pequeños grupos, raramente aisladas. A veces fuera de los prados, pero siempre en zonas abiertas de bosques, jardines y parques
Observaciones	En los mismos ambientes crecen <i>Entoloma hirtipes</i> (primaveral) o <i>Entoloma sericeum</i> (otoñal/invernal), con olor a harina rancia. La intoxicación por <i>Entoloma vernum</i> presenta dolores abdominales con diarrea profusa. <i>Marasmius oreades</i> es una especie que crece durante todo el año, principalmente en prados formando corros de brujas, pero en ocasiones aparece fuera de los prados en claros de bosques, pudiendo confundirse entonces con <i>Entoloma vernum</i> . No puede comercializarse ninguna especie del género <i>Entoloma</i> .	