

***Galerina marginata* (Batsch) Kühner**



© José Félix Mateo y Miguel Ángel Ribes **Seta rebordeada**

***Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.**



© Miguel Ángel Ribes

***Galerina badipes* (Pers.) Kühner**



© Ibai Olariaga

	<i>Galerina marginata</i>	<i>Galerina badipes</i>	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>
Sombrero	Convexo a plano convexo, higrófono, pardo ocráceo, crema ocráceo al secar	Cónico campanulado, luego convexo, higrófono, de color miel a amarillo ocráceo, margen muy estriado	Campanulado convexo, luego aplanado, elástico, muy higrófono, pardo anaranjado, crema amarillento al secar
Pie	Color miel en la parte superior, más oscuro hasta pardo negruzco hacia la base, con fibrillas blanquecinas a ocráceas bajo el anillo	Color miel en la parte superior, más oscuro hasta pardo negruzco hacia la base, con plaquitas o fibrillas blanquecinas bajo un resto anular más o menos fugaz	Firme y elástico de color blanquecino, gradualmente pardo más o menos intenso, con un anillo membranoso y persistente, con escamas parduzcas debajo de él
Carne	Del mismo color que el sombrero. Olor harinoso	Del mismo color que el sombrero. Inodora	De color semejante al sombrero, de olor suave
Hábitat	En bosques de coníferas, sobre tocones o restos de madera podrida	En bosques de coníferas, entre restos vegetales, a veces enterrados	En madera de planifolios, especialmente hayas y abedules, en bosques de montaña, de forma fasciculada
Observaciones	<i>Galerina marginata</i> y <i>G. badipes</i> , muy similares, son pequeños hongos marrones ocráceos con alta toxicidad, que provocan una intoxicación hepatotóxica (síndrome faloidiano) potencialmente mortal, debido a la presencia de amatoxinas. En general se recomienda no consumir especies de este género, todas sospechosas, no pudiendo comercializarse ninguna. <i>Kuehneromyces mutabilis</i> , una especie comestible que incluso se cultiva, no es comercializable en España y es muy similar a las <i>Galerina</i> tóxicas.		