

Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet



© Fermín Pancorbo

Lepista personata (Fr.) Cooke



© Fermín Pancorbo
Pie violeta, seta de riñón, pezón azul

Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet



© Pablo Pérez-Daniëls

	Hebeloma sinapizans	Lepista personata
Sombrero	Al principio hemisférico, finalmente aplanado. Cutícula viscosa en tiempo húmedo, de color pardo ocráceo rosado, blanquecina en el borde	Al principio hemisférico, finalmente aplanado. Cutícula seca de color pardo gris ocráceo
Láminas	Apretadas, de color ocre, al final pardo	Densas, de color crema blanquecino
Pie	Blanquecino, hueco, dejando un apéndice triangular carnoso en lo alto	Corto, de color violáceo
Carne	Compacta, blanquecina, con olor a rábano o patata cruda. Sabor amargo	Compacta, blanca, de sabor suave. Olor afrutado fúngico
Hábitat	Muy abundante en todo tipo de bosques en otoño	En praderas y jardines
Observaciones	Aunque el aspecto general de ambas especies puede parecer similar, <i>Lepista personata</i> tiene la cutícula seca, las láminas blanquecinas, el pie con tonos violáceos y olor fúngico, mientras que <i>Hebeloma sinapizans</i> tiene la cutícula viscosa, láminas oscuras, pie sin tonos violáceos y olor a rábano o patata cruda. El género <i>Hebeloma</i> en general produce intoxicaciones de tipo digestivo con un período de incubación breve, que cursan con una sintomatología de náuseas, vómitos y diarreas. No se puede comercializar ninguna especie del género <i>Hebeloma</i> .	