

***Pholiotina aporos* (Kits van Wav.) Clemençon**



© Fermín Pancorbo

***Marasmius oreades* (Bolton) Fr.**



© Francisco Sánchez

Senderuela, seta de carrerilla

***Pholiotina vexans* (P.D. Orton) Bon**



© Fermín Pancorbo

|                      | <b><i>Pholiotina aporos</i></b>   | <b><i>Pholiotina vexans</i></b>   | <b><i>Marasmius oreades</i></b>  |
|----------------------|---|---|--|
| <b>Sombrero</b>      | Cutícula higrófana de color pardo rojizo a ocráceo, margen estriado   | Cónico obtuso a campanulado, pardo ocráceo, pardo amarillento, estriado   | Cutícula higrófana. Color pardo avellana, crema con la edad, margen estriado   |
| <b>Láminas</b>       | Distantes, de color beige, al final pardas  | Pardo amarillentas, adnatas, densas                                       | Blancas, distantes, espaciadas   |
| <b>Pie</b>           | Fibriloso, hueco, con anillo en forma de faldita  | Crema, pruinoso por encima del anillo, por debajo estriado a liso. Frágil | Elástico y tenaz. Soporta bien 2-3 vueltas de torsión sin romperse. Sin anillo |
| <b>Carne</b>         | Parduzca, de olor a geranio   | Sin olor y sabor distintivo, de color crema                               | Blanquecina, con olor a almendras amargas                                      |
| <b>Observaciones</b> | El género <i>Pholiotina</i> en general debe considerarse tóxico por la presencia de amatoxinas en varias de sus especies. <i>Marasmius oreades</i> (senderuela) es fácil de diferenciar de las especies de <i>Pholiotina</i> por su porte más robusto, las láminas blancas, la ausencia de anillo, el olor y la resistencia del pie. No se puede comercializar ninguna especie del género <i>Pholiotina</i> . |   |  |