

***Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini** (\equiv *Boletus lupinus* Fr.)



Boleto de lobo

© Juan Carlos Campos

***Butyriboletus pseudoregius* (Hubert) D. Arora & J.L. Frank** (\equiv *Boletus pseudoregius* Hubert ex Estadés)



© Miguel Ángel Ribes

***Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini** (\equiv *Boletus lupinus* Fr.)



Boleto de lobo

© José Félix Mateo

	<i>Rubroboletus lupinus</i>	<i>Butyriboletus pseudoregius</i>
Sombrero	Variable, sobre todo con tonos rosados, anaranjados a rojizos	Rosa sucio a pardo
Poros	Amarillo anaranjados que acaban rojizos. Azulean a la presión o al roce	Amarillentos, oliváceos en la madurez. Al roce verde azulados
Pie	Más o menos cilíndrico, atenuado en la base, de color amarillo con tonos más rosados u ocre en la base. Liso a ligeramente granulado	Cilíndrico a claviforme, de color amarillo con tonalidades rojizas en la zona central y basal. Retículo bastante marcado, del mismo color que el pie
Carne	Amarilla, en la base más rosada. Azulea al corte, menos en la base del pie	Amarillo pálido con tonos rosados en la base. Azulea al corte, sobre todo en el sombrero
Observaciones	Ambas especies se diferencian bastante bien por el color de los poros (naranja en <i>Rubroboletus lupinus</i> y amarillos en <i>Butyriboletus pseudoregius</i>), la ornamentación del pie (liso a granulado en <i>R. lupinus</i> y con retículo en <i>B. pseudoregius</i>) y el cambio de color de la carne al corte. <i>Butyriboletus pseudoregius</i> , aunque buen comestible, es una especie rara y no comercializable. No se conocen casos concretos de intoxicación por <i>R. lupinus</i> , pero por su parecido con otros <i>Boletus</i> tóxicos, se desaconseja su consumo.	

Rubroboletus pulchrotinctus (Alessio) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (≡ *Boletus pulchrotinctus* Alessio)



© Jorge Hernanz

Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J.L. Frank
(≡ *Boletus fechtneri* Velen.)



© Miguel Ángel Ribes y Javier Marcos

Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank
(≡ *Boletus regius* Krombh.)



Boleto real

© José Cuesta y Miguel Ángel Ribes

	<i>Rubroboletus pulchrotinctus</i>	<i>Butyriboletus fechtneri</i>	<i>Butyriboletus regius</i>
Sombrero	Rosado sobre fondo ocre pálido, con el borde especialmente rosado	De blanco grisáceo a pardo claro con reflejos rosados. Al roce con tonalidades ocre	De color rojo carmín. Se agrieta con facilidad
Poros	Amarillos de joven, después anaranjados. Azulean débilmente al roce	Amarillo oro, después oliváceos. Azulean ligeramente al roce	Amarillo intenso. Azulean levemente al roce
Pie	Similar al sombrero, amarillento con esfumaciones ocre a rosadas, con retículo fino del mismo color que el pie	Amarillento con esfumaciones rojizas en la parte central. Azulea al tacto. Retículo fino del mismo color que el pie	Amarillo limón con esfumaciones rojizas hacia la base. Con retículo fino en el ápice. Azulea levemente al roce
Carne	Amarillo pálido, azulea débilmente. De sabor dulzón y olor desagradable, sobre todo en la madurez	Amarillo pálido, azulea al corte más intensamente en el ápice del pie. Sabor dulce, olor agradable y aromático	Amarillo intenso, ligeramente púrpura bajo la superficie; celeste claro al cortarla. Sabor y olor suaves y agradable
Observaciones	Las tres especies se diferencian por la combinación de colores del sombrero, poros, pie y carne. <i>B. fechtneri</i> y <i>B. regius</i> , aunque buenos comestibles cocinados, no son comercializables, además el segundo es bastante escaso. Se sospecha de la toxicidad de <i>R. pulchrotinctus</i> , incluso cocinado, por lo que se desaconseja su consumo.		

Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu
L. Yang (≡ *Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb.)



Seta de esponja de encina

© José Cuesta

Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu
L. Yang (≡ *Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb.)



Seta de esponja de encina

© Pablo Pérez-Daniéls

Baorangia emileorum (Barbier) Vizzini, Simon & Gelardi
 (≡ *Boletus emileorum* Barbier) (= *Boletus spretus* Bertéa)



© Javier Marcos

	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i>	<i>Baorangia emileorum</i>
Sombrero	Blanco sucio con bordes rosados a rojizos. Al roce enrojece o pardea	Rojizo rosáceo. Azulea con la manipulación
Poros	Enseguida de color rojo sangre. Azul oscuro a la presión	Amarillo dorado, después anaranjado sucio. Azulean a la presión
Pie	Ventrudo a claviforme, amarillo anaranjado en el ápice, el resto más rojizo. Con retículo de color rojo carmín	Muy corto, ligeramente radicante. Liso con esfumaciones rojizas
Carne	Amarillo vivo, azuleando al corte en el sombrero y en la parte alta del pie. Olor y sabor agradable	Blanco amarillento, azuleando al corte. Sabor ácido
Observaciones	El color del sombrero es blanquecino con bordes rosados en <i>Rubroboletus rhodoxanthus</i> , mientras que en <i>Baorangia emileorum</i> es rojizo. Los poros de color rojo sangre son muy distintos a los de color amarillo anaranjado de <i>B. emileorum</i> . El pie de <i>R. rhodoxanthus</i> presenta retículo, mientras que el de <i>B. emileorum</i> no. <i>B. emileorum</i> es un buen comestible, pero no se puede comercializar, además dada su rareza no debería de recolectarse. <i>R. rhodoxanthus</i> es una especie tóxica, al menos en crudo.	

Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
(≡ *Boletus satanas* Lenz)



Boleto de Satanás, mataparientes
© Miguel Ángel Ribes

Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
(≡ *Boletus satanas* Lenz)



Boleto de Satanás, mataparientes
© Miguel Ángel Ribes y Javier Marcos

Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini
(≡ *Boletus calopus* Pers.)



Pie rojo amargo
© Miguel Ángel Ribes

	<i>Rubroboletus satanas</i>	<i>Caloboletus calopus</i>
Sombrero	Grande, de 10 a 25 cm. Con bultos y abolladuras. Blanco sucio a grisáceo, sin tonos rosas	Grande, de 10 a 15 cm. Color muy variable, desde blanco ocre hasta amarillo oliváceo, incluso con tonos castaños
Poros	Primero amarillo anaranjado, pero pronto de color rojo sangre a rojo anaranjado. Azulean a la presión	Amarillos de joven, luego ocre oliváceos, nunca rojos. Azul verdoso a la presión
Pie	Ventrudo. Amarillo rojizo en el ápice a rojo intenso en el centro y hacia la base. Retículo rojizo más marcado en la parte alta del pie	Claviforme a cilíndrico. Amarillento ocráceo en el tercio superior. Rojo intenso en el resto. Retículo muy marcado, más rojizo en la parte superior
Carne	Amarillenta a blancuzca, que azulea débilmente al corte. Olor desagradable, sobre todo cuando está maduro. Sabor dulzaino	Blanca azuleando al corte. Sabor muy amargo. Olor afrutado
Observaciones	A pesar de su nombre popular "Boleto de Satanás" o "mataparientes", y de ser una especie tóxica, tanto en crudo como cocinada, generalmente no presenta cuadros de intoxicación graves, ni mucho menos mortales. <i>Rubroboletus satanas</i> se diferencia bien de <i>Caloboletus calopus</i> por sus tonos blanquecinos sin manchas rosadas en el sombrero y por sus poros de color rojo intenso. <i>C. calopus</i> no es una especie tóxica, pero su gran amargor la hace incomedible.	