

***Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (≡ *Clitocybe clavipes* (Pers.) P. Kumm.)**



© Miguel Ángel Ribes

***Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja (≡ *Clitocybe geotropa* (Bull.) Quéél.)**



© Nino Santamaría

Cabeza de fraile, platera

***Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm.**



© Nino Santamaría

Pardilla

	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	<i>Clitocybe nebularis</i>	<i>Infundibulicybe geotropa</i>
Olor	Suave, afrutado	Fuerte y muy característico, desagradable en la madurez	Ciánico, como de almendras amargas
Láminas	Muy decurrentes, no separables del sombrero	Poco decurrentes, separables del sombrero como en las especies del género <i>Lepista</i>	Marcadamente decurrentes
Carne	Blanda, esponjosa	Firme	Fibrosa y relativamente elástica
Pie	Pardo grisáceo oscuro, que contrasta con el color de las láminas	Crema a pardo grisáceo, que no contrasta demasiado con el color de las láminas	Cilíndrico, progresivamente ensanchado hacia la base, de color semejante a las láminas y al sombrero
Observaciones	<i>Clitocybe nebularis</i> es ampliamente recolectada y consumida en muchas regiones (País Vasco, Navarra, Castilla y León), sin embargo es causante de intolerancias digestivas en muchas personas, incluso bien cocinada, por lo que no debe consumirse y está prohibida su comercialización. <i>Clitocybe clavipes</i> , considerado como comestible mediocre en algunas guías, no comercializable, no debe consumirse, pues es causante de intoxicación cardiovascular (síndrome nitritoide) cuando se ingiere con bebidas alcohólicas. Ambas especies podrían confundirse con <i>Clitocybe geotropa</i> , buen comestible y comercializable.		