

Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio



© Juan Carlos Zamora

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla, ratón

Tricholoma portentosum (Fr.) Quéll.



Capuchina, seta de charol

© Juan Carlos Zamora

	Tricholoma filamentosum	Tricholoma terreum	Tricholoma portentosum
Sombrero	4-15 cm, escamoso o más o menos fibriloso, no viscoso	2-6 (8) cm, escamoso o seríceo, no viscoso	4-15 cm, radialmente fibriloso, viscoso en tiempo húmedo
Pie	Blanquecino, robusto y resistente	Blanco grisáceo, esbelto y frágil	Blanco amarillento, robusto y resistente
Láminas	Blancas, algo crema grisáceas en la madurez	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas, con tendencia rosada o grisácea en la madurez
Hábitat	Típico de hayedos (<i>Fagus</i>)	Típico de coníferas	Típico de coníferas, raro en planifolios
Observaciones	<i>Tricholoma filamentosum</i> es fácil de confundir con muchas otras especies parecidas a <i>T. terreum</i> , por ejemplo <i>T. bonii</i> , <i>T. triste</i> , <i>T. sculpturatum</i> , <i>T. inocybeoides</i> , etc., y también con el grupo de <i>T. orirubens</i> , <i>T. atosquamosum</i> , etc.		

Tricholoma josserandii Bon



© Juan Antonio Sánchez

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla, ratón

Tricholoma portentosum (Fr.) Quéll.



© Javier Marcos

Capuchina, seta de charol

	<i>Tricholoma josserandii</i>	<i>Tricholoma terreum</i>	<i>Tricholoma portentosum</i>
Sombrero	Radialmente fibriloso a algo escamoso, no viscoso	Escamoso a seríceo, no viscoso	Radialmente fibriloso, viscoso en tiempo húmedo
Pie	Blanco, sin cortina	Blanco grisáceo, a veces con cortina	Blanco amarillento, sin cortina
Láminas	Blancas, algo crema grisáceas en la vejez	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas con tendencia rosada o grisácea en la madurez
Sabor	Desagradable	Agradable, sutil	Agradable, harinoso
Observaciones	<i>Tricholoma josserandii</i> es fácil de confundir con muchas otras especies parecidas a <i>T. terreum</i> , por ejemplo <i>T. bonii</i> , <i>T. triste</i> , <i>T. scalpturatum</i> , <i>T. inocybeoides</i> , etc.		

Tricholoma pardinum (Pers.) Quél.



Atigrado, falsa negrilla

© Miguel Ángel Ribes

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.



Negrilla, ratón

© Miguel Ángel Ribes

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.



Capuchina, seta de charol

© Miguel Ángel Ribes

	Tricholoma pardinum	Tricholoma terreum	Tricholoma portentosum
Sombrero	4-15 cm, con escamas más o menos concéntricas	2-6 (8) cm, escamoso a seríceo, no viscoso	4-15 cm, radialmente fibriloso, viscoso en tiempo húmedo
Pie	Blanquecino, tendencia a pardear, robusto y resistente	Blanco grisáceo, no pardea, esbelto y frágil	Blanco amarillento, no pardea, robusto y resistente
Láminas	Blancas, algo crema grisáceas en la madurez	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas, con tendencia rosada o grisácea en la madurez
Observaciones	<i>Tricholoma pardinum</i> es fácil de confundir con muchas otras especies parecidas a <i>T. terreum</i> , por ejemplo <i>T. bonii</i> , <i>T. triste</i> , <i>T. sculpturatum</i> , <i>T. inocybeoides</i> , etc., y también con el grupo de <i>T. orirubens</i> , <i>T. atosquamosum</i> , etc.		

Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin



© Miguel Ángel Ribes

Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin



© Miguel Ángel Ribes

Tricholoma portentosum (Fr.) QuéL.



© Miguel Ángel Ribes

Capuchina, seta de charol

	Tricholoma sciodes	Tricholoma portentosum
Sombrero	Frecuentemente cónico en la juventud, con mamelón más o menos agudo, apenas viscoso en tiempo húmedo, siempre sin tonos amarillentos	Acampanado a convexo en la juventud, con mamelón más o menos ancho, viscoso en tiempo húmedo, a veces con tonos amarillentos en las zonas poco pigmentadas
Pie	Blanco, con tonos grisáceos	Blanco, con tonos amarillentos
Láminas	Blanco grisáceas a grises, con el margen punteado de negro	Blanco amarillentas, a veces algo rosadas o grisáceas en la madurez, margen no punteado de negro
Sabor	Desagradable, algo amargo	Agradable, harinoso
Hábitat	Típico de hayedos (<i>Fagus</i>), a veces bajo coníferas (<i>Pinus</i>)	Típico de bosques de coníferas, sobre todo <i>Pinus sylvestris</i> , raro bajo planifolios (<i>Quercus</i> , <i>Fagus</i>)
Observaciones	Extremar las precauciones con cuerpos fructíferos de <i>T. portentosum</i> muy jóvenes (por falta de desarrollo en forma y coloración) o muy viejos (por la coloración grisácea que pueden adoptar las láminas). Es posible confundir <i>T. sciodes</i> con muchos otros <i>Tricholoma</i> grises, ej., grupo de <i>T. terreum</i> y <i>T. scalpturatum</i> , algo más pequeños y escamosos, mamelón ancho y frágiles, y grupo de <i>T. atosquamosum</i> y <i>T. squarrulosum</i> , de sombrero escamoso lanoso y pie a menudo ensanchado en la base (en <i>T. squarrulosum</i> escamoso y oscuro).	

Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél.



© Juan Carlos Zamora

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.



© Miguel Ángel Ribes

Capuchina, seta de charol

Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél.



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Tricholoma sejunctum</i>	<i>Tricholoma portentosum</i>
Sombrero	Amarillo verdoso, con fibrillas más oscuras y negruzco hacia el disco central	Principalmente grisáceo negruzco, fibriloso, con tonos amarillentos en algunas zonas
Sabor	De ligera a netamente amargo	Agradable, harinoso
Hábitat	Típico de planifolios (fagáceas)	Típico de bosques de coníferas, sobre todo <i>Pinus sylvestris</i> , raro bajo planifolios (<i>Quercus</i> , <i>Fagus</i>)
Observaciones	Las formas oscuras de <i>T. sejunctum</i> pueden ser muy difíciles de separar de ejemplares particularmente amarillentos de <i>T. portentosum</i> . Hay otras especies relacionadas con <i>T. sejunctum</i> que pueden ser incluso más parecidas a <i>T. portentosum</i> , como <i>T. viridilutescens</i> , <i>T. rufenum</i> o <i>T. guldeniae</i> , algunas de ellas asociadas con coníferas. También <i>T. arvernense</i> (de otro grupo, con fíbulas en las hifas), que tiene tonos anaranjados, se presta a veces a confusión.	

***Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm. s.l.**



Azufrado, seta azufrada

© Miguel Ángel Ribes

***Hygrophorus abieticola* Krieglst. ex Gröger & Bresinsky
(y otros *Hygrophorus* amarillos o naranjas)**



© Miguel Ángel Ribes

***Tricholoma bufonium* (Pers.) Gillet**



Azufrado, seta azufrada

© Miguel Ángel Ribes

	<i>Tricholoma sulphureum</i> / <i>bufonium</i>	<i>Hygrophorus abieticola</i> (y otros amarillos o naranjas)
Sombrero	Superficie velutina a ligeramente escamosa, seca	Superficie más o menos lisa o fibrilosa, casi siempre viscosa
Láminas	Amarillo azufre a amarillo intenso, a menudo algo ventrudas, escotadas sinuadas	No amarillo azufre en su totalidad, generalmente no ventrudas, más o menos decurrentes
Pie	Con toda su superficie uniforme, fibrilosa a ligeramente escamosa, sin zona anular	Frecuentemente ornamentado con escamas o una cubierta gelatinosa, excepto en el ápice, donde a menudo hay una zona anular
Carne	Amarilla, con olor muy intenso y desagradable a gas de alumbrado	Blanquecina, nunca con olor a gas de alumbrado
Observaciones	<i>Tricholoma sulphureum</i> es un complejo de especies cuya taxonomía aún no está resuelta. En este grupo se incluye <i>T. bufonium</i> , que se ha venido separando por el sombrero pardo rojizo o algo purpúreo, un carácter variable. Teniendo en cuenta su coloración y sobre todo su olor, son difíciles de confundir con especies comestibles, pero por su porte y láminas relativamente separadas, algunas especies de <i>Hygrophorus</i> o <i>Collybia</i> s.l. podrían llegar a ser remotamente parecidas, pero no se pueden comercializar, excepto <i>Hygrophorus agathosmus</i> , <i>H. gliocyclus</i> , <i>H. penarius</i> , <i>H. latitabundus</i> (<i>limacinus</i>), <i>H. marzuolus</i> e <i>H. russula</i> .	

Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla picante, falsa negrilla

Tricholoma portentosum (Fr.) Quéll.



© Luis Alberto Parra

Capuchina, seta de charol

Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla picante, falsa negrilla

	<i>Tricholoma virgatum</i>	<i>Tricholoma portentosum</i>
Sombrero	Típicamente cónico en la juventud, con mamelón puntiagudo, apenas viscoso en tiempo húmedo, siempre sin tonos amarillentos	Acampanado a convexo en la juventud, con mamelón más o menos ancho, viscoso en tiempo húmedo, a veces con tonos amarillentos en las zonas poco pigmentadas
Pie	Blanco con tonos grisáceos	Blanco con tonos amarillentos
Láminas	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas, a veces algo rosadas o grisáceas en la madurez
Sabor	Desagradable, amargo picante	Agradable, harinoso
Observaciones	Extremar las precauciones con cuerpos fructíferos de <i>T. portentosum</i> muy jóvenes (por falta de desarrollo en forma y coloración) o muy viejos (por la coloración grisácea que pueden adoptar las láminas). También es posible confundir <i>T. virgatum</i> con muchos otros <i>Tricholoma</i> grises, como los del grupo de <i>T. terreum</i> y <i>T. sculpturatum</i> , más pequeños y escamosos, con mamelón ancho y frágiles, así como con los del grupo de <i>T. atrosquamosum</i> y <i>T. squarulosum</i> , de sombrero más escamoso lanoso y pie a menudo ensanchado en la base (en <i>T. squarulosum</i> además con numerosas escamitas oscuras).	