2025

Mariposa del mes

ENE	FEB	MAR	**ABR**	MAY	JUN	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

Cryphia pallida (Bethune-Baker, 1894)

NATURA 2000

RESERVA NATURAL EL REGAJAL mar de ontígola

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA

Mariposas nocturnas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Cryphia pallida es una mariposa de pequeño tamaño, con una envergadura alar de entre 20 y 22 milímetros. Especie con una coloración bastante variable en cuanto al tono general, gris o verdoso. Las alas anteriores se pueden dividir en cuatro áreas diferentes; una región basal seguida de una banda mediana; esa banda mediana está delimitada a cada lado por una línea negra que dibuja unos pequeños arcos en el lado basal; esta banda es verde, verde pálido, blanquecina o incluso amarillenta y es de color más claro que la siguiente área posmediana, la cual es más oscura y está ampliada por un lóbulo ancho junto al borde costal; los tonos de color de la zona mediana se reencuentran en la zona submarginal y la franja está salpicada de blanco y negro. Las alas traseras son de un color marrón grisáceo uniforme.

Oruga de 15 a 17 mm de longitud, jaspeada de color verde y beige pálido con galones negros o manchas negras en los lados y una hilera dorsal de manchas blancas. La cabeza es ocre con reticulado negro. Crisálida de color amarillento acaramelado.

¿Grado de protección?

Cryphia pallida carece de protección porque no la necesita. Las poblaciones madrileñas se mantienen estables y el factor de riesgo más importante para su supervivencia es la pérdida de hábitat. También puede verse afectada, como muchas otras especies de mariposas nocturnas, por la contaminación lumínica.

¿Sabías que?

Este noctuido, como muchos de sus congéneres, vuela de noche y es atraído por la luz. Cuando las alas están plegadas es increíblemente mimética con los líquenes que tapizan las cortezas de los árboles y arbustos del ecosistema donde viven, prácticamente indistinguible.

Su descubridor fue el entomólogo inglés George Thomas Bethune-Baker (Birmingham, 20 de julio de 1857 – Eastbourne, 1 de diciembre de 1944) . Su colección se encuentra depositada en el Museo de Zoología de la Universidad de Cambridge (una parte) y en el Museo de Historia Natural de Londres (el resto).

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie atlanto-mediterránea. Vive en Europa meridional y central, España y Portugal, sur de Francia y centro de Italia y en todo el norte de África. En la península ibérica se distribuye principalmente por el centro y el tercio oriental, aunque se ha citado recientemente de Lugo. Relativamente escasa, por zonas, en la Comunidad de Madrid. En el Parque Regional del Sureste se conoce de Aranjuez (El Regajal), Chinchón, San Martín de la Vega y Rivas-Vaciamadrid, donde no es excesivamente rara.

¿Cuál es su hábitat?

Esta especie, que pertenece a la familia Noctuidae, aparece en bosques de árboles caducifolios, en especial de diversos *Quercus* y *Populus nigra*. También en parques y jardines que mantengan árboles de esas especies y algunos frutales.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas de *Cryphia pallida* se alimentan de líquenes de los géneros *Parmelia, Cladonia, Parmelia* y *Xanthoria* que crecen sobre los troncos de los árboles indicados. En el PRS son frecuentes las siguientes especies de líquenes: *Xanthoria parietina, Cladonia foliacea, Cladonia convoluta, Parmelia quercina, Physcia ascendens* y *Physcia aipolia*.

Reserva Natural EL Regajal-Mar de Ontígola. Subdirección General de Espacios Protegidos. Comunidad de Madrid.
Información: *El Campillo Rivas Vaciamadrid Telefono: 62965847*

RESERVA NATURAL EL REGAJAL mar de ontígola

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Comunidad de Madrid